

MRSA-Sanierung im Heim oder zu Hause

Vor einer Sanierung sollte ein Kolonisations-Status vorliegen:

- Nasenvorhöfe
- Rachen
- Haut (Stirn-Haaransatz, Achselhöhlen, Leisten, Anus-Damm)
- Wunde

**1 Woche
Standardsanierung**

**3 Tage
Pause**

**1. Abstrich-
Kontrolle**

**2. Abstrich-Kontrolle
zwischen 3. und 6. Monat**

**3. Abstrich-Kontrolle
im 12. Monat**

Standardsanierung (1 Woche)

1. 3 x täglich Mupirocin-Nasensalbe (z.B. Turixin® Salbe) in beide Nasenvorhöfe einbringen.
(alternativ: bei Mupirocin-Resistenz: PVP-Jod, 1,25%).
2. 2-3 x täglich Rachenspülung mit antiseptischer Lösung (z.B. Pronto Oral®, Chlorhexidin-haltige Präparate oder Octenidol® etc.).
3. Bei positiven Befunden von anderen Körperstellen ggf. Hautwaschungen oder Duschen mit einer antiseptischen Seife, z.B. 1-2 x täglich mit z.B. Octenisan®, Decontaman®, Prontoderm® oder Skinsan Scrub® (inkl. Haare!). Einwirkzeiten beachten!

**Bei jedem Wirkstoff die
Herstellerangaben beachten!**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Gesundheitsamt Neumarkt (☎ 09181-470512)

Während der Standardsanierung Ober- und Unterbekleidung sowie Bettwäsche, Handtücher und Waschlappen täglich in die normale Wäsche; Deo-Spray statt Deo-Roller; Seifenspender statt Seifenstück; Kämme, Zahnbürsten, Rasierapparate einschl. Scherblätter, Brillen, Hörgeräte und Zahnprothesen täglich desinfizieren.

Händedesinfektion vor und nach jedem Körperkontakt mit dem Patienten oder mit kontaminierten Gegenständen, auch wenn Einmalhandschuhe getragen werden!!

Schutzkittel bei engem Körperkontakt und bei Kontakt mit Körpersekreten oder Ausscheidungen.

Einmalhandschuhe bei engem Körperkontakt und bei Kontakt mit Körpersekreten und Ausscheidungen; bei Versorgung von Wunden, Kathetern, Sonden oder Tracheostomata. Die Handschuhe sofort entsorgen und anschließend die Hände desinfizieren!

Mund-Nasen-Schutz beim endotrachealen Absaugen sowie bei hustenden Patienten.

Hauben oder **Überschuhe** sind in der Regel nicht notwendig.



**Die richtige
Händedesinfektion
in 30 Sekunden**



Eine hohle Hand voll
Händedesinfektionsmittel
(ca. 3-5ml = 2-3 Spenderhübe)
bis zur Trocknung einreiben.



Besonders wichtig:
Finger- und Daumenkuppen,
Handinnenflächen und
Fingerzwischenräume



**Methicillin-
Resistenter
Staphylococcus
Aureus**

 Gesundheitsamt im
Landkreis Neumarkt/OPf.


 Rettungsdienst
im Landkreis Neumarkt/OPf.


 Alten- und Pflegeheime
im Landkreis Neumarkt/OPf.

 Ambulante Pflegedienste
im Landkreis Neumarkt/OPf.

 Arztpraxen
im Landkreis Neumarkt/OPf.

 Klinikum
Neumarkt/Parsberg

 Kuratorium für Dialyse
und Nierentransplantation
Neumarkt/OPf.

 Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation Berching

MRSA

**Sanierung
im Heim
oder zu Hause**

www.mre-netzwerk-neumarkt.de