

MRSA-Sanierung im Heim oder zu Hause

Vor einer Sanierung sollte ein Kolonisations-Status vorliegen:

- Nasenvorhöfe
- Rachen
- Haut (Stirn-Haaransatz, Achselhöhlen, Leisten, Anus-Damm)
- Wunde

**1 Woche
Standardsanierung**

**3 Tage
Pause**

**1. Abstrich-
Kontrolle**

**2. Abstrich-Kontrolle
zwischen 3. und 6. Monat**

**3. Abstrich-Kontrolle
im 12. Monat**

Standardsanierung (1 Woche)

1. 3 x täglich Mupirocin-Nasensalbe (z.B. Turixin® Salbe) in beide Nasenvorhöfe einbringen.
Alternativ bei Mupirocin-Resistenz: Octenisan® Nasengel
2. 3 x täglich Mund- und Rachenspülung mit antiseptischer Lösung (z.B. Octenidin oder Chlorhexidin als Mundspüllösung).
3. Täglich (mind. über 3 Tage) Ganzkörperwaschung inkl. der Haare mit einer antiseptischen Waschlösung mit nachgewiesener MRSA-Wirksamkeit (z.B. mit Wirkstoff Octenidin) Einwirkzeiten beachten!

**Bei jedem Wirkstoff die
Herstellerangaben beachten!**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Gesundheitsamt Neumarkt (☎ 09181-470-1512)

Während der Standardsanierung täglicher Wechsel der Kleidung; Bettwäsche, Handtücher und Waschlappen täglich in die normale Wäsche; Deo-Spray statt Deo-Roller; Seifenspendler statt Seifenstück; Kämme und Zahnbürsten erneuern; Rasierapparate einschl. Scherblätter, Brillen, Hörgeräte und Zahnprothesen täglich desinfizieren.

Händedesinfektion vor und nach jedem Körperkontakt mit dem Patienten oder mit kontaminierten Gegenständen, auch wenn Einmalhandschuhe getragen werden!!

Schutzkittel und Haube bei engem Körperkontakt und bei Kontakt mit Körpersekreten oder Ausscheidungen.

Einmalhandschuhe bei engem Körperkontakt und bei Kontakt mit Körpersekreten und Ausscheidungen; bei Versorgung von Wunden, Kathetern, Sonden oder Tracheostomata. Die Handschuhe sofort entsorgen und anschließend die Hände desinfizieren!

Mund-Nasen-Schutz beim endotrachealen Absaugen sowie bei hustenden Patienten.

Am wichtigsten: Achten Sie immer auf eine sorgfältige Händehygiene!

**Die richtige
Händedesinfektion
in 30 Sekunden**



Eine hohle Hand voll
Händedesinfektionsmittel
(ca. 3-5ml = 2-3 Spenderhübe)
bis zur Trocknung einreiben.



Besonders wichtig:
Finger- und Daumenkuppen,
Handinnenflächen und
Fingerzwischenräume



Kliniken des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf.

MRE
NETZWERK
Landkreis Neumarkt/OPf.

**Methicillin-
Resistenter
Staphylococcus
Aureus**

- Gesundheitsamt im Landkreis Neumarkt/OPf.
- Rettungsdienst im Landkreis Neumarkt/OPf.
- Alten- und Pflegeheime im Landkreis Neumarkt/OPf.
- Ambulante Pflegedienste im Landkreis Neumarkt/OPf.
- Arztpraxen im Landkreis Neumarkt/OPf.
- Klinikum Neumarkt/Parsberg
- Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation Neumarkt/OPf.
- Fachklinik für Geriatriische Rehabilitation Berching

MRSA

**Sanierung
im Heim
oder zu Hause**

www.mre-netzwerk-neumarkt.de